



Proces ved personuheld med kemikalier eller andet.

FØR UHELDET

Sikre dig før du påbegynder arbejde at der er førstehjælpsudstyr og øjenskyll er fyldt op (gul sikkerhedszone). kontakt kemifagkoordinator, hvis noget mangler eller ikke er ajour.

UNDER UHELDET

FØRSTEHJÆLP

- 1) Stands ulykken
- 2) Giv livreddende førstehjælp
- 3) Tilkald nødvendig hjælp
- 4) Giv almindelig førstehjælp.

SKADESTUEN OG 112

Ring **ALTID** 112 hvis det skønnes nødvendigt. Sørg for, at der er nogen, som kan hjælpe redningsfolkene med at finde vej til ulykken.

ÆTSNINGER

Ved ætsninger skyl, skyl og bliv ved med at skylle, indtil der kommer nogen og tilser dig. Ætsninger er irreversibel nedbrydning af vævet. Syreætsninger giver ofte overfladiske, skorpeagtige ætsninger. Baseætsninger giver dybe ætsninger.

Øjne: Skyl omgående øjne med øjenbruser, eller hvad der er tilgængeligt. Øjnene skal aktivt holdes åbne for at sikre effektiv skylning. Fjern kontaktlinser med det samme. Der bør skylles i mindst 10-20 minutter og i længere tid, hvis der er tale om base-ætsning. Fortsæt skylning til læge overtager behandling. Forsøg ikke neutralisering med syre/base.

Hud: Omgående skylning med vand, evt. under bruseren/hanen. Fjern forurenede tøj. Der skylles længe og grundigt. Forsøg ikke neutralisering med syre/base.

Indånding: Frisk luft og overvej lægehjælp.

Indtagelse: Giv vand. Fremkald ikke opkastning. Forsøg ikke neutralisering med syre/base.

FORBRÆNDINGER

- Ved forbrændinger skal der straks skylles med koldt vand og skylles længe
- Fjern løstsiddende tøj over det forbrændte område
- Bliv ved at skylle
- Der hentes køligt vand i en passende størrelse beholder
- Det forbrændte parti dyppes ned i vandet og holdes der, indtil smerten er forsvundet, dog mindst 1/2 time
- Et koldt, drivvådt omslag lægges på det forbrændte parti
- Hvis det skønnes nødvendigt, bringes den forbrændte på skadestuen.

STIKSKADER OG STÆNK PÅ SLIMHINDER

I forbindelse med uheld, hvor personer ved stik-/skære-uheld eller ved sprøjt/stænk på slimhinder udsættes for kontakt med blod og vævsvæsker, kan der være risiko for smitte med Hepatitis B, Hepatitis C og/eller HIV. Der skal altid tages kontakt til skadestuen så hurtigt som muligt, og i hvert fald inden for samme døgn. HUSK øjet er også smittevej for HIV og hepatitis.

Hudlæsioner

Stikker eller skærer du dig på en genstand, som er forurenede med blod eller vævsvæske, skal nedenstående følges:

- Vask grundigt med vand og sæbe
- Såret desinficeres 2 gange med 0,5 % Klorhexidinsprit, 70 % hospitalssprit eller 2,5 % jod-sprit.

Stænk på slimhinder

Får du blod eller vævsvæske i øjne, mund eller åbne sår, skylles med rigeligt øjenskylllevæske, saltvand eller rent vand.

EFTER UHELDET

REGISTRER HÆNDELSER

- Arbejdsskader og nær-ved-ulykker anmeldes. Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant. Det er vigtigt, at arbejdsskader og nærved-ulykker granskes for at forebygge lignende hændelser.